




# Denke ans Delir - CAM-ICU Pocketcard

Screening möglich ab RASS > -3/-2. Delir ist gegeben, wenn Kriterium 1, 2 und 3 bzw. 4 zutreffen



\* DD: Delir und/oder: Demenz, Depression, Intoxikation, Enzephalitis, Epilepsie usw.

Delir positiv: Ursachen ermitteln & Delirmanagement einleiten

UKSH Pflegeforschung 2024

CAM-ICU: Copyright © 2002, E. Wesley Ely, MD, MPH and Vanderbilt University, all rights reserved

2. Wahl: Symptome pharmakologisch lindern

1. Wahl: nicht-pharmakologische Maßnahmen: Kommunikation ermöglichen, Delir erklären, Mobil, wdh. Re-Orientierung, Angehörige integrieren, ggf. Brille/Hörgerät, Flüssigkeit u.a., Delir Management: Ursachen ermitteln: Infektionen, Neuro-Status, Delir-Labor, Medikation u.a.

		RASS: Richmond Agitation Sedation Scale (Screening: min 8h)	
Hypoaktives Delir möglich	Delir möglich	+ 4	Sehr streitlustig
		+ 3	Sehr agitiert
		+ 2	Agitiert
		+ 1	Unruhig
Hypoaktives Delir nicht feststellbar	Delir nicht feststellbar	0	Aufmerksam ruhig
		-1	Schläfrigkeit
		-2	Leichte Sedierung
		-3	Mäßige Sedierung
Hyperaktives Delir möglich	Delir möglich	-4	Tiefe Sedierung
		-5	Nicht erweckbar
		+ 1	Unruhig
		+ 2	Agitiert
Hyperaktives Delir nicht feststellbar	Delir nicht feststellbar	+ 3	Sehr agitiert
		+ 4	Sehr streitlustig
		-4	Tiefe Sedierung
		-5	Nicht erweckbar

